

บรรณาธิการแถลง

วารสารโลหิตวิทยา ฉบับ 9/2 มีนิพนธ์ต้นฉบับเพียงเรื่องเดียว คือเรื่อง "Detection of Red Cell Antibodies by Enzyme Technique" โดยคุณกาญจนา เอื้อตระกูลพูนสุข และคณะ โดยมีบทบรรณาธิการของ รศ.พญ.ศศิธร เพชรจันทร์ เรื่อง "Enzyme" ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคนิคเอนไซม์ในการตรวจทาง red cell serology ดียิ่งขึ้น สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือบทความการประชุมใหญ่วิชาการ ประจำปี 2542 ซึ่งมีทั้งหมด 11 เรื่อง และบทความพิเศษ เรื่อง "The National Blood Program 1969-1998" โดย ศ.นพ.ชัยเวช นุชประยูร เป็นการบันทึกรวบรวมงานของศูนย์บริการโลหิตฯ ที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆ ในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์บริการโลหิตฯ จนถึงระยะเวลาที่ท่านเป็น

ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเสนอเป้าหมายในอนาคตของศูนย์บริการโลหิตฯ ไว้อย่างน่าสนใจ

นอกจากนี้เมื่อวารสาร 2 เรื่องจาก พญ.สร้อยสองค์ พิกุลสด และที่พิเศษสำหรับฉบับนี้คือกลอนเกี่ยวกับการใช้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่เหมาะสม จาก พญ. นันทิยา ดันตชุลณ์ ซึ่งเขียนจากความบันดาลใจเมื่อครั้งได้ฟังการบรรยายเรื่องนี้ของบรรณาธิการที่โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก จึงขอท่านมาลงพิมพ์ให้พวกเราได้สัมผัสกับบรรณรศของคำกลอนบ้าง ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พิมพ์ เชี่ยวศิลป์
บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง

วารสารโลหิตวิทยาฉบับที่ 2 ของปีที่ 9 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2542 ทางฝ่ายโลหิตวิทยามีนินพจน์ต้นฉบับเรื่องเดียวที่ส่งมาจาก คุณกาญจนา เอื้อตระกูลพูนสุข และคณะ จากภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก และภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง "ธาลัสซีเมีย และภาวะขาดเหล็กในกลุ่มประชากรที่ให้ผลบวกต่อการตรวจกรอง OF Test และ KRU-DCIP-Clear" พบว่า osmotic fragility test มีผลบวกปลอมสูง การทดสอบนี้จึงควรระมัดระวังในการแปลผลบทความที่ปรึกษา เรื่อง "Antiplatelet Agents" ปัจจุบันนี้เมียที่มีฤทธิ์ต้านเกร็ดเลือดตัวใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งจะมีราคาแพงขึ้นเป็นเงาตามตัว การใช้ยาต้านเกร็ดเลือดจึงควรระมัดระวังให้ใช้ให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อประโยชน์สูงสุดให้ผู้ป่วยในการรักษาและป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ทำให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญด้วย

รายงานผู้ป่วยเรื่อง "ประสิทธิภาพของยา intravenous immunoglobulin (IVIg) ในการรักษาภาวะเกร็ดเลือดต่ำจากออโตอิมมูนในผู้ใหญ่ ซึ่งต้องการรักษา

มาตรฐาน : รายงานผู้ป่วย 6 ราย" โดยนายแพทย์ ดันตน์นำเบญจพล และคณะ ผู้ป่วย ITP มีน้อยรายที่ต้องการรักษาด้วย prednisolone และมีอาการเลือดออก ทั้งๆ ที่ตัดม้ามแล้ว การใช้ยา IVIg นี้เป็นทางเลือกทางหนึ่ง แพทย์ผู้รักษาจะต้องคิดถึงผลดีของยาและราคาของยาเพื่อที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสม

ในวันที่ 24-28 ตุลาคม 2542 นี้ ทางสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย Seameo Tromed Network และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัด IX Congress of The International Society of Hematology : Asian-Pacific Division ขึ้นที่ Bangkok Convention Center โรงแรม เซนทรัล แกรนด์ พลาซ่า ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมโลหิตวิทยา และท่านผู้สนใจเข้าประชุมศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ด้านโลหิตวิทยาและการบริการโลหิตจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ

วิชัย ประยูรวิวัฒน์

บรรณาธิการ