

บรรณาธิการแถลง

“นโยบายเร่งรัดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) กระทรวงสาธารณสุข”

ในเดือนตุลาคม 2566 กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายเร่งรัดการฉีดวัคซีนเอชพีวี (HPV) เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในสตรีไทยที่อายุน้อยกว่า 45 ปี มะเร็งปากมดลูก มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส Human Papilloma Virus หรือเชื้อไวรัส HPV ที่เนื้อเยื่อปากมดลูก ทำให้เซลล์บริเวณปากมดลูกเจริญผิดปกติและก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกตามมา โรคมะเร็งปากมดลูกสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนเอชพีวี (HPV) ซึ่งมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันในผู้ที่ยังไม่พบการติดเชื้อเอชพีวี มาก่อนระหว่าง ร้อยละ 93 – 95

ในเดือนตุลาคม 2566 กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายฉีดวัคซีน HPV โดยมีแผนเร่งรัดการฉีดวัคซีนเอชพีวี (HPV) นั้นในกลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงอุดมศึกษาปีที่ 2 (หรืออายุ 11 - 20 ปี) โดยตามนโยบายเน้นบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายก่อน และวางแผนจะให้วัคซีนในกลุ่มเป้าหมายให้ครบ 2 เข็มต่อไป โดยระยะการฉีดห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน ทั้งนี้นโยบายมีจุดมุ่งหมายให้สตรีไทยอายุ 11 - 20 ปี ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเอชพีวีเพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันประเทศไทยปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2566 นี้ มีบทความที่น่าสนใจได้แก่ ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความดันโลหิตสูงในผู้ที่มาตรวจสุขภาพ เพื่อประเมินความพร้อมในการทำงานคนประจำเรือ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 คลินิกหมอครอบครัว เป็นต้น

และขอขอบพระคุณผู้พิมพ์ ผู้สนับสนุนการจัดทำวารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง

ทีมงานบรรณาธิการจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพวารสารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย
บรรณาธิการ