

ใบแก้ไขข้อผิดพลาด (Erratum)

นิพนธ์ต้นฉบับ “ปริมาตรเลือดแดงในเลือดและระดับไมโครบิลูบินที่ 48 ชั่วโมง ภายหลังการผ่าตัดทำคลอดของทารกครรภ์ครบกำหนด เปรียบเทียบระหว่างการรีดเลือดสายสะดือกับการหนีบสายสะดือเร็ว” โดย วิชาญ แก้วเขียว หน้า 52 (ปีที่ 42 ฉบับที่ 2) ก.ค.-ธ.ค. 2564 มีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในส่วนของตัวเลข ตารางที่ 2

คะแนน APGAR ที่ 5 นาที คอลัมน์หนีบสายสะดือเร็ว 0.99 ± 0.92 ให้แก้เป็น 9.99 ± 0.92

คะแนน APGAR ที่ 10 นาที คอลัมน์รีดเลือดสายสะดือ 0.99 ± 0.10 ให้แก้เป็น 9.99 ± 0.10

คะแนน APGAR ที่ 10 นาที คอลัมน์หนีบสายสะดือเร็ว 0.96 ± 0.23 ให้แก้เป็น 9.96 ± 0.23

โดยได้แก้ไขให้ถูกต้อง ดังนี้

ข้อมูล	รีดเลือดและสายสะดือ (n=96) mean $\pm$ SD	หนีบสายสะดือเร็ว (n=110) mean $\pm$ SD	ค่า P
เพศชาย ราย (ร้อยละ)	54 (56.3)	65 (59.1)	0.777
น้ำหนักตัว (กรัม)	3,233 $\pm$ 454	3,254 $\pm$ 440	0.740
พิสัย	2,245 - 5,125	2,125 - 4,357	
คะแนน APGAR ที่ 1 นาที	8.44 $\pm$ 0.54	8.44 $\pm$ 0.53	0.228
คะแนน APGAR ที่ 5 นาที	9.91 $\pm$ 0.39	9.99 $\pm$ 0.92	0.853
คะแนน APGAR ที่ 10 นาที	9.99 $\pm$ 0.10	9.96 $\pm$ 0.23	1.000
สัญญาณชีพหลังคลอด			
อุณหภูมิร่างกาย ($^{\circ}$ C)	36.9 $\pm$ 0.2	36.9 $\pm$ 0.2	0.091
อัตราการเต้นของหัวใจ (ครั้ง/วินาที)	148 $\pm$ 10	149 $\pm$ 10	0.285
อัตราการหายใจ (ครั้ง/วินาที)	53.6 $\pm$ 4.6	55.8 $\pm$ 11.3	0.079
มีภาวะ hypothermia $<36.5^{\circ}$ C ราย (ร้อยละ)	1 (1.0)	2 (1.8)	1.000