



ปกิณกะ การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2550

ชรินทร์ ลิ้มสนธิกุล, วท.ม.*

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้คาดการณ์ไว้ว่า ภายในปี พ.ศ. 2563 โรคซึมเศร้าจะเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความสูญเสียที่สำคัญเป็นอันดับ 2 รองจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และจากผลการศึกษาภาวะทางสุขภาพจากโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ปี พ.ศ. 2547 พบว่า

1. โรคซึมเศร้า เป็นสาเหตุอันดับ 4 ของความสูญเสียปีสุขภาวะ (Disability-Adjusted Life Years-DALYs) ในประชากรเพศหญิง และเป็นสาเหตุอันดับ 10 ของความสูญเสียในเพศชาย เมื่อพิจารณาถึงการสูญเสียปีสุขภาวะโดยรวม

2. เมื่อพิจารณาเฉพาะจำนวนปีที่สูญเสียเนื่องจากภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (Years of Life Lost due to Disability-

YLDs) พบว่า โรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการสูญเสียในประชากรเพศหญิง และเป็นสาเหตุอันดับ 2 ของการสูญเสียในเพศชาย

กรมสุขภาพจิตได้สำรวจทางระบาดวิทยา อัตราความชุกของโรคซึมเศร้า เมื่อปี พ.ศ. 2546 พบว่า โรคซึมเศร้าชนิดรุนแรง (Major Depression) อัตราความชุก 3.2% ของประชากร โรคซึมเศร้าเรื้อรัง (Dysthymia) อัตราความชุก 1.18% ของประชากร และความผิดปกติทางอารมณ์แบบมีอาการทางจิต (Mood disorder with psychotic features) อัตราความชุก 0.38% ของประชากร คิดเป็นอัตราความชุกของโรคซึมเศร้า โดยรวม 4.76% ของประชากร (ประมาณ 3 ล้านคน)

จำนวนและอัตราผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในสถานบริการทั่วประเทศ 4 ปีย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2547-2550) ดังตารางที่ 1

* ศูนย์สารสนเทศ กรมสุขภาพจิต

ตารางที่ 1 จำนวนและอัตราผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในสถานบริการทั่วประเทศ 4 ปี
ย้อนหลัง (ปี พ.ศ. 2547-2550)

ปี	(1) จำนวนประชากร ประเทศไทย (คน)	(2) ประมาณการ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (คน)*	(3) จำนวนผู้ป่วยโรค ซึมเศร้าที่มารับบริการ (คน)	(4) อัตราการเข้าถึงบริการ ของผู้ป่วยโรค ซึมเศร้า***	(5) การเพิ่มของอัตรา การเข้าถึงบริการ **
2547	61,973,621	2,949,944	87,101	2.95%	
2548	62,418,054	2,971,099	93,566	3.15%	+0.20%
2549	62,828,706	2,980,669	121,665	4.08%	+0.93%
2550	63,038,247	3,000,621	123,616	4.12%	+0.04%
เฉลี่ย 3 ปี				3.78%	+0.39%

* คำนวณจากอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าที่สำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2546 (= 4.76%)

** คำนวณอัตราจากจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการเพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้มารับบริการในปีก่อน

*** คำนวณจาก (จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการ/ประมาณการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั้งประเทศ)*100

การให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า โดยมีจำนวนการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าในสถานบริการทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.
2550 ประมาณการว่าจะมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
จำนวน 3,000,621 คน สถานบริการสาธารณสุข

ทั่วประเทศ มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามารับบริการ
จำนวน 123,616 คน คิดเป็นอัตรา 196.10 ต่อ
ประชากรแสนคน หรือมีอัตราร้อยละการเข้าถึง
บริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 4.12 โดยจำแนก
ตามเขตต่างๆ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจำแนกตามเขต

เขต	ประมาณการผู้ป่วย โรคซึมเศร้า (คน)*	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่มารับบริการ (คน)	อัตราการเข้าถึงบริการของ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
กทม.	272,093	25,860	9.50
1	273,692	12,793	4.67
2	163,778	3,056	1.87
3	127,634	3,575	2.80
4	141,189	23,832	16.88
5	91,315	1,361	1.49
6	158,997	5,558	3.50
7	76,864	2,782	3.62
8	144,158	2,115	1.47
9	120,974	2,604	2.15
10	168,811	2,762	1.64
11	148,692	2,718	1.83
12	190,258	3,783	1.99
13	313,267	8,358	2.67
14	196,930	11,635	5.91
15	77,707	2,229	2.87
16	124,707	3,087	2.48
17	46,316	773	1.67
18	86,633	546	0.63
19	76,607	4,189	5.47
รวม	3,000,621	123,616	4.12

สรุปผล

1. 5 อันดับแรกของเขตตรวจราชการที่มีอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากที่สุด ได้แก่

- อันดับที่ 1 ได้แก่ เขต 4 อัตราฯ 16.88 เป็นที่ตั้งของ โรงพยาบาลศรีธัญญา
- อันดับที่ 2 ได้แก่ กรุงเทพฯ อัตราฯ 9.50 เป็นที่ตั้งของสถาบันจิตเวช-ศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
- อันดับที่ 3 ได้แก่ เขต 14 อัตราฯ 5.91 เป็นที่ตั้งของ โรงพยาบาลพระศรี-มหาโพธิ์
- อันดับที่ 4 ได้แก่ เขต 19 อัตราฯ 5.47 เป็นที่ตั้งของ โรงพยาบาลจิตเวช สงขลาราชนครินทร์
- อันดับที่ 5 ได้แก่ เขต 1 อัตราฯ 4.67 เป็นที่ตั้งของ โรงพยาบาลสวนปรุง และสถาบันพัฒนาการเด็กกราช-นครินทร์

2. 5 อันดับสุดท้ายของเขตตรวจราชการที่มีอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าน้อยที่สุด ได้แก่

- อันดับที่ 1 ได้แก่ เขต 18 อัตราฯ 0.63
- อันดับที่ 2 ได้แก่ เขต 8 อัตราฯ 1.47 เป็นที่ตั้งของ โรงพยาบาลจิตเวช สระแก้วราชนครินทร์ และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
- อันดับที่ 3 ได้แก่ เขต 5 อัตราฯ 1.49
- อันดับที่ 4 ได้แก่ เขต 10 อัตราฯ 1.64

เป็นที่ตั้งของ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์

3. 10 อันดับแรกของจังหวัดที่มีอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าน้อยที่สุด ได้แก่

- อันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี อัตราฯ 44.39
- อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อัตราฯ 12.20
- อันดับที่ 3 ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ อัตราฯ 9.50
- อันดับที่ 4 ได้แก่ จังหวัดแพร่ อัตราฯ 9.05
- อันดับที่ 5 ได้แก่ จังหวัดพัทลุง อัตราฯ 8.64
- อันดับที่ 6 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อัตราฯ 7.68
- อันดับที่ 7 ได้แก่ จังหวัดพะเยา อัตราฯ 7.29
- อันดับที่ 8 ได้แก่ จังหวัดเลย อัตราฯ 6.76
- อันดับที่ 9 ได้แก่ จังหวัดสงขลา อัตราฯ 6.60
- อันดับที่ 10 ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม อัตราฯ 6.17

4. 10 อันดับสุดท้ายของจังหวัดที่มีอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าน้อยที่สุด ได้แก่

- อันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดระนอง อัตราฯ 0.09

อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดสตูล อัตรา 0.18

อันดับที่ 3 ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด อัตรา
0.20

อันดับที่ 4 ได้แก่ จังหวัดปัตตานี อัตรา
0.24

อันดับที่ 5 ได้แก่ จังหวัดนครปฐม อัตรา
0.29

อันดับที่ 6 ได้แก่ จังหวัดยะลา อัตรา
0.33

อันดับที่ 7 ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี อัตรา
0.35

อันดับที่ 8 ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี อัตรา
0.38

อันดับที่ 9 ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา
0.41

อันดับที่ 10 ได้แก่ จังหวัดสระบุรี
อัตรา 0.42

ตารางที่ 3 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จำแนกรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2550

เขตตรวจราชการ	จังหวัด	ปี 2547		ปี 2548		ปี 2549		ปี 2550		ประมาณการประชากรที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า					อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า				
		จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ปี 2547	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2550	ปี 2547	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2550
4	นนทบุรี	9,241	4,059	13,083	21,639	44,853	46,281	46,931	48,751	20.60	8.77	27.88	44.39						
14	อุบลราชธานี	14,713	1,283	13,102	10,368	83,922	84,481	84,656	85,000	17.53	1.52	15.48	12.20						
	กรุงเทพมหานคร	12,910	29,098	21,880	25,860	268,185	269,366	270,421	272,093	4.81	10.80	8.09	9.50						
	แพร่	1,264	258	1,313	2,007	22,532	22,441	22,328	22,176	5.61	1.15	5.88	9.05						
	พัทลุง	45	187	930	2,066	23,719	23,824	23,871	23,922	0.19	0.78	3.90	8.64						
	เชียงใหม่	2,009	4,046	3,430	6,087	77,625	78,540	78,859	79,225	2.59	5.15	4.35	7.68						
	พะเยา	445	909	1,052	1,688	23,245	23,176	23,172	23,161	1.91	3.92	4.54	7.29						
10	เลย	1,430	1,821	6,452	1,980	29,058	29,151	29,129	29,300	4.92	6.25	22.15	6.76						
19	สงขลา	1,909	2,329	2,919	4,165	61,000	61,995	62,274	63,066	3.13	3.76	4.69	6.60						
	สมุทรสงคราม	396	359	851	572	9,292	9,285	9,282	9,244	4.26	3.87	9.17	6.19						
6	ราชบุรี	1,072	1,041	1,375	2,247	38,798	39,198	39,341	39,576	2.76	2.66	3.50	5.68						
	สมุทรสาคร	259	432	3,675	1,199	21,072	21,516	21,795	22,369	1.23	2.01	16.86	5.36						
	สุพรรณบุรี	320	1,701	243	2,060	39,987	40,108	40,120	40,107	0.80	4.24	0.61	5.14						
3	นครสวรรค์	1,540	1,951	1,758	2,481	51,287	51,304	51,206	51,107	3.00	3.80	3.43	4.85						
	สุรินทร์	883	1,266	831	3,139	65,280	65,436	65,377	65,339	1.35	1.93	1.27	4.80						
	พระนครศรีอยุธยา	2,023	1,997	1,087	1,672	35,243	35,553	35,738	36,210	5.74	5.62	3.04	4.62						
15	สุราษฎร์ธานี	2,787	1,897	2,908	1,922	44,661	45,094	45,408	46,192	6.24	4.21	6.40	4.16						
	นครพนม	129	2,210	4,525	1,305	32,899	33,015	33,036	33,182	0.39	6.69	13.70	3.93						
	ขอนแก่น	4,544	5,019	2,143	3,114	82,907	83,183	83,177	83,415	5.48	6.03	2.58	3.73						
	สระแก้ว	1,805	257	670	921	25,523	25,560	25,595	25,663	7.07	1.01	2.62	3.59						
	ประจวบคีรีขันธ์	334	214	469	788	22,833	23,172	23,361	23,542	1.46	0.92	2.01	3.35						
1	ลำปาง	1,939	2,919	2,967	1,180	37,077	36,972	36,870	36,681	5.23	7.90	8.05	3.22						
13	นครราชสีมา	1,293	1,680	3,447	3,678	120,873	121,226	121,400	121,518	1.07	1.39	2.84	3.03						
17	พังงา	490	108	637	351	11,379	11,493	11,613	11,752	4.31	0.94	5.49	2.99						
	จันทบุรี	629	465	365	694	23,514	23,712	23,808	23,991	2.67	1.96	1.53	2.89						

ตารางที่ 3 อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จำแนกรายจังหวัด ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2550 (ต่อ)

เขตตรวจราชการ	จังหวัด	ปี 2547		ปี 2548		ปี 2549		ปี 2550		ประมาณการประชากรที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า					อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า				
		จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ปี 2547	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2550	ปี 2547	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2550
9	กาญจนบุรี	631	1,515	615	1,136	38,569	39,326	39,642	39,759	1.64	3.85	1.55	2.86						
	พิษณุโลก	537	1,233	1,224	1,120	40,057	40,030	40,127	40,064	1.34	3.08	3.05	2.80						
	ถนบุรี	153	852	3,697	995	35,675	35,793	35,788	35,691	0.43	2.38	10.33	2.79						
	ลำพูน	563	1,374	1,780	519	19,268	19,265	19,299	19,285	2.92	7.13	9.22	2.69						
	อ่างทอง	141	194	240	357	13,469	13,508	13,504	13,538	1.05	1.44	1.78	2.64						
	เพชรบูรณ์	3,535	920	426	1,178	47,656	47,717	47,663	47,482	7.42	1.93	0.89	2.48						
	ชลบุรี	590	1,101	1,426	1,388	54,406	55,808	56,711	58,712	1.08	1.97	2.51	2.36						
	ยโสธร	79	98	147	605	25,767	25,764	25,729	25,682	0.31	0.38	0.57	2.36						
	อุทัยธานี	150	148	113	333	15,518	15,552	15,547	15,564	0.97	0.95	0.73	2.14						
	เชียงราย	599	856	842	1,030	57,806	58,313	58,553	58,311	1.04	1.47	1.44	1.77						
	ภูเก็ต	535	146	88	254	13,609	13,911	14,117	15,018	3.93	1.05	0.62	1.69						
	สุโขทัย	193	216	3,727	443	29,102	29,053	28,977	28,812	0.66	0.74	12.86	1.54						
	ชัยภูมิ	2,111	4,038	2,259	809	53,175	53,166	53,180	53,293	3.97	7.60	4.25	1.52						
	กาฬสินธุ์	563	462	221	696	46,234	46,341	46,353	46,529	1.22	1.00	0.48	1.50						
	ระยอง	138	118	414	414	25,889	26,615	26,959	27,773	0.53	0.44	1.54	1.49						
	สมุทรปราการ	759	932	624	731	49,952	51,290	52,040	53,642	1.52	1.82	1.20	1.36						
	กำแพงเพชร	238	630	54	454	34,578	34,665	34,630	34,557	0.69	1.82	0.16	1.31						
	ชุมพร	116	101	97	299	22,470	22,646	22,710	22,910	0.52	0.45	0.43	1.31						
12	ชัยนาท	465	215	323	206	16,255	16,190	16,140	16,048	2.86	1.33	2.00	1.28						
	มหาสารคาม	43	151	75	547	44,508	44,596	44,539	44,554	0.10	0.34	0.17	1.23						
	นราธิวาส	0	115	200	399	33,024	33,345	33,515	33,868	0.00	0.34	0.60	1.18						
	พิจิตร	289	606	46	307	26,676	26,599	26,549	26,406	1.08	2.28	0.17	1.16						
	อำนาจเจริญ	147	129	130	204	17,494	17,554	17,537	17,560	0.84	0.73	0.74	1.16						
	สกลนคร	61	570	540	577	52,437	52,555	52,652	52,982	0.12	1.08	1.03	1.09						
7	ตราด	140	414	79	108	10,374	10,431	10,482	10,498	1.35	3.97	0.75	1.03						
	เพชรบุรี	222	180	126	223	21,469	21,610	21,665	21,709	1.03	0.83	0.56	1.03						
	นครศรีธรรมราช	546	504	1,179	736	71,416	71,610	71,717	71,733	0.76	0.70	1.64	1.03						
16	ปราจีนบุรี	110	305	300	218	21,227	21,402	21,509	21,657	0.92	1.43	1.39	1.01						

56-66

63

ข้อเสนอ การปรับปรุงตัวชี้วัดด้านสุขภาพจิต ในปีงบประมาณ 2552

ตารางที่ 4 ต้นแบบตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

1. รหัสตัวชี้วัด	0402
2. ชื่อตัวชี้วัด	การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 105 ของปีงบประมาณ 2551
3. เกณฑ์	ใช้ผลงานของปีงบประมาณ 2551 เป็นฐาน
4. ผลงาน	
4.1 รายการข้อมูล	04021 จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการรายจังหวัดในปีงบประมาณ 2551 (หน่วยนับ : คน)
4.2 นิยาม	การวินิจฉัยผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพื่อบ่งชี้ว่าเป็นการเข้าถึงบริการจะต้องดำเนินการตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 คือ 1. การใช้แบบคัดกรองซึมเศร้า หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษานในสถานบริการสาธารณสุขได้รับการคัดกรองจากบุคลากรที่ผ่านการอบรมการใช้แบบคัดกรองซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิตแล้วพบว่าป่วยด้วยโรคซึมเศร้า 2. การวินิจฉัยผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยแพทย์ หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลในสถานบริการสาธารณสุขแล้ว

แพทย์มีการวินิจฉัยพบว่าป่วยด้วยโรค ตามรหัสโรค ICD-10 โรคใดโรคหนึ่ง ดังนี้

F30 ความผิดปกติทางอารมณ์เป็นครั้งคราว ความผิดปกติคลั่ง เศร้าสลับกัน ความผิดปกติทางอารมณ์เป็นครั้งคราวเพียงอย่างเดียว

F31 ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เกิดซ้ำและมีทั้งซึมเศร้าหรือตื่นเต้น ลักษณะเฉพาะต้องมีระดับอารมณ์สองสภาวะขึ้นไป และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน บางครั้งร่าเริง ขยัน ว่องไว (คลั่งหรือบ้าคลั่ง) บางครั้งอารมณ์เศร้า เบื่อหน่าย เชื่องช้า (อารมณ์เศร้า)

F32 อารมณ์ซึมเศร้าชั่วคราวซ้ำๆ อาการเฉพาะ คือ อารมณ์เศร้าเล็กน้อย ปานกลางหรือรุนแรง ทำให้เกิดทุกข์ทรมานจากอารมณ์

F33 อาการซึมเศร้าซ้ำ อาการเฉพาะ คือ มีการกลับเป็นซ้ำของอารมณ์เศร้า พบอาการซึมเศร้าชั่วคราวซ้ำๆ โดยไม่มีอารมณ์ร่าเริงและขยัน (บ้าคลั่ง)

F34 โรคอารมณ์แฉ่งไวกษนิคถาวร ความผิดปกติและความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ชนิดถาวร แต่ไม่รุนแรง แค่ คลั่ง หรือ อารมณ์ซึมเศร้าชั่วคราวซ้ำๆ ไม่รุนแรง แต่จะมีอาการเป็นปีๆ หรือยาวนานในชีวิต

F38 โรคอารมณ์แฉ่งไวกว อื่นๆ ความผิดปกติทางอารมณ์อื่นๆ ที่ไม่เข้ากับกลุ่ม F30-F34 เพราะอาการไม่รุนแรงและระยะเวลาป่วยไม่นาน

F39 โรคอารมณ์แฉ่งไวกว ที่ไม่ระบุ โรคจิตทางอารมณ์ หมายเหตุ การวินิจฉัยผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ไม่นับรวม F30 ความผิดปกติทางอารมณ์เป็นครั้งคราวเพราะรหัสโรคนี้จะมีการรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช

(ที่มา : จากหนังสือบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ICD-10 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10)

4.3 วิธีรายงาน	(ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน)					
	4.3.1 รายงานเป็นรายเดือน					
	4.3.2 รายงานผลงานสะสม (ต้องไม่น้อยกว่าเดือนก่อนหน้า)					
4.4 แหล่งข้อมูล	รายงานผู้ป่วยของสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละจังหวัด					
5. ประชากรเป้าหมาย						
5.1 รายการข้อมูล	00017 จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2551 (หน่วยนับ : คน)					
5.2 นิยาม	จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละจังหวัด ในปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 ถึง 30 กันยายน 2551)					
5.3 วิธีการรายงาน	(ความถี่ในการเก็บข้อมูลและรายงาน)					
	5.3.1 เป็นข้อมูลพื้นฐานรายงานครั้งเดียว					
5.4 แหล่งข้อมูล	จากรายงานผู้ป่วยของสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละจังหวัด					
6. การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ)	$0402 = \frac{\text{ผลงาน (04021)} * 100}{\text{ประชากรเป้าหมาย (00017)}}$					
7. เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	1	2	3	4	5
	ร้อยละผลงาน	95	97.5	100	102.5	105
หมายเหตุ						