

ส่วนแก้ไขบทคัดย่อวารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 หน้า 60

ปัจจัยทำนายความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารี (PREDICTING FACTORS OF MEDICATION ADHERENCE AMONG MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS AFTER UNDERWENT PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION)*

อิสริย์กร สุรศรีสกุล พย.ม. (Issareegorn Surasrisakul, M.N.S)**

นุสลักษณ์ เอื้อกิจ พส.ด. (Noraluk Ua-Kit, Ph.D)***

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย เพื่อศึกษาอำนาจทำนายของปัจจัยทำนาย ได้แก่ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ ภาวะซึมเศร้า ภาวะโรคร่วม การรับรู้สมรรถนะแห่งตน และการสนับสนุนทางสังคม กับความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารี กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารี จำนวน 154 คน เลือกแบบหลายขั้นตอน แผนกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจและหลอดเลือด สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลตำรวจ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ความร่วมมือในการรับประทานยา การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค ภาวะซึมเศร้า การสนับสนุนทางสังคม

คำสำคัญ : ความร่วมมือในการรับประทานยา กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การขยายหลอดเลือดโคโรนารี

* วิทยานิพนธ์ ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก “ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต” บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทุนสนับสนุนการวิจัยจาก คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

** นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

***อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการรับประทานยา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเชิงชั้น

ผลการวิจัยพบว่า ความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หลังได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารีโดยรวมอยู่ในระดับสูง ($\bar{X} = 31.50$, $SD = 4.04$) ผลการวิเคราะห์อำนาจของปัจจัยทำนาย สามารถร่วมกันทำนายความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารีร้อยละ 21.0 ($R^2 = 0.210$, $F = 4.821$, $p = .000$) โดยการรับรู้อุปสรรคและการรับรู้ประโยชน์เป็นตัวแปรที่สามารถทำนายความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลังได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($\beta = -.232$, $t = -2.567$ และ $\beta = .264$, $t = 2.604$, $p < .05$ ตามลำดับ)

ส่วนแก้ไขวารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 หน้าปก



วารสารพยาบาลตำรวจ

JOURNAL OF THE POLICE NURSES

ปีที่ 5 เล่ม 1 มกราคม-มิถุนายน 2556

ISSN 1906-652X

- ✧ การออกกำลังกาย: พลตอสตรีตั้งครุฑและการในครุฑ ศิริมา เขมะเพชร
- ✧ ผลการปฎิษากฎกฏการปฎิษาแบบเล่าเรื่องต่อการเสียวยาตนเองของสตรีหย่าร้าง กรรณิการ์ แสนสุภา
เพ็ญนภา กลุณกาศ
จุฑามาส แพร่จอน
- ✧ ผลการปฎิษาตามทฤษฎีโครงสร้าง ต่อองบทกการเป็นมารดาวัยรุ่น มารีสา พร้อมพวงศกร
เพ็ญนภา กลุณกาศ
คณดาว ปุณณนัท
- ✧ การพัฒนาหุ่น Police Wound เพื่อฝึกทักษะการจัดการบาดแผล กัญญา เตหาเสยิย
สกาพร กลางสาร
- ✧ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักการและเทคนิคการดูแลผู้ที่มีบาดแผล อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์
วรรณี ศรีวัลย์
ภาคนจนา เลิศภาวสสสม
- ✧ ประสิทธผลของการฝึกปฎิษิตการพยาบาลอนามัยชุมชนแบบใช้วิจัยเป็นฐาน
ของนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอเรือ วันราพร เทยสุวรรณ
ฉนวนกนา ชันวิสิทธิ์
อนรณพย์ ณ บางช้าง
ชนุตรา เกิดมณี
- ✧ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง พนอ กัทิมทอง
รุ่งระวี นาวิโรจณ
- ✧ ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง: การทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ จารณี กิรภัทรพัทธ์
ชนกพร จิตนิภกนา
- ✧ โครงการนำร่องเพื่อการส่งเสริมการใช้และการเข้าถึงถุงยางอนามัยอย่างทั่วถึง
ของข้าราชการตำรวจในจังหวัดกาญจนบุรี ชฎาพร คงเพ็ชร
และคณะ
- ✧ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของข้าราชการตำรวจ
ในจังหวัดกาญจนบุรี ชฎาพร คงเพ็ชร
และคณะ
- ✧ โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ชฎาพร คงเพ็ชร
และคณะ